

# BOSENTAN (Tracleer®)

## Quelle est l'utilisation du bosentan (Tracleer®)?

Le bosentan (Tracleer®) est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). L'HTAP est définie par une pression artérielle élevée dans les poumons due au fait que les artères pulmonaires, les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les poumons, se sont rétrécies ou cicatrisées.

## Comment le médicament agit-il?

Le bosentan (Tracleer®) est un antagoniste des récepteurs de l'endothéline (ARE) qui abaisse la tension artérielle dans les poumons, ce qui permet au cœur de pomper le sang plus efficacement. Le bosentan (Tracleer®) aide à prévenir le rétrécissement des vaisseaux sanguins en bloquant l'endothéline, une protéine qui cause la vasoconstriction, dans les artères pulmonaires. La prise de ce médicament peut ralentir la progression de l'HTAP et soulager ses symptômes.

## Que dois-je savoir?

### Contre-indications :

Ne prenez pas de bosentan (Tracleer®) si :

- Vous êtes allergique au bosentan (Tracleer®) ou à l'un de ses ingrédients
- Vous allaitez
- Vous avez une maladie du foie

Si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de le devenir, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale; ce médicament est connu pour causer des anomalies congénitales graves.

### Important information:

- Évitez le jus de pamplemousse
- Ce médicament peut causer des problèmes au niveau du foie et de l'anémie; des analyses sanguines seront effectuées régulièrement

## Interactions médicamenteuses

Les médicaments suivants peuvent interagir avec le bosentan (Tracleer®). Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des interactions médicamenteuses.

***Veuillez parler avec votre équipe médicale avant de commencer à prendre tout nouveau médicament.***

**Les anticoagulants** — p. ex., warfarine (Coumadin®)

**Les médicaments utilisés pour traiter le diabète** — p. ex., glyburide (Diabeta®, Euglucon®)

**Les antibiotiques** — p. ex., clarithromycine (Biaxin®) et rifampine (Rofact®)

**Les médicaments utilisés pour traiter des infections fongiques** — p. ex., kétoconazole (Apo-Ketoconazole®) et voriconazole (Vfend®)

**Les immunosuppresseurs** — p. ex., cyclosporine (Neoral®, Sandimmune®), tacrolimus (Advagraf®, Prograf®) et sirolimus (Rapamune®)

**Les médicaments utilisés pour traiter une infection à VIH** — p. ex., darunavir (Prezista®), ritonavir (Norvir®), nelfinavir (Viracept®), et autres

**Les contraceptifs hormonaux**

## Comment dois-je prendre le bosentan (Tracleer®)?

Prenez un comprimé, deux fois par jour, avec ou sans nourriture.

Pendant les quatre premières semaines, vous prendrez des comprimés de 62,5 mg, deux fois par jour. Si vous tolérez cette dose, on vous conseillera de passer à la dose de 125 mg, deux fois par jour.

### Remarque:

Veuillez mentionner à votre équipe médicale TOUS les médicaments que vous prenez, incluant les médicaments en vente libre, les vitamines, les minéraux, les suppléments et produits de santé naturels et les produits de médecine douce.

# BOSENTAN (Tracleer®)

## Dose oubliée :

Si vous oubliez de prendre une dose de bosentan (Tracleer®), prenez le comprimé dès que vous constatez cet oubli. Ne prenez pas deux doses en même temps. Si le moment est presque venu de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée; prenez simplement la dose suivante à l'heure prévue.

## Quels sont les effets secondaires fréquents?

Certains patients peuvent présenter des effets secondaires quand ils prennent ce médicament. Si les effets secondaires sont graves ou inconfortables, veuillez communiquer avec votre équipe médicale. Les effets secondaires peuvent comprendre:

- Mal de tête
- Bouffées vasomotrices (rougissement accompagné d'une sensation de chaleur)
- Palpitations
- Rétention de liquides (enflure)
- Congestion nasale
- Résultats anormaux des tests de la fonction hépatique (du foie)

## Renseignements additionnels :

Conservez le médicament hors de la portée des enfants à 15°-30° C.

N'utilisez pas de médicaments périmés.

Ne jetez aucun médicament dans un évier ou une toilette, ni dans les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de quelle façon vous devez éliminer vos médicaments si vous n'en n'avez plus besoin.

Pour plus d'information, veuillez consulter la monographie complète du produit.

## Dans quelles circonstances devrais-je communiquer avec ma clinique d'HTP ou consulter un médecin?

Communiquez immédiatement avec votre équipe médicale ou consultez un médecin si vous présentez :

- Un jaunissement de la peau ou des yeux, de la nausée et des vomissements, de la fièvre, de la fatigue et/ou des douleurs abdominales
- Des symptômes d'une aggravation de l'HTP, incluant : une difficulté à respirer, une rétention de liquides ou une prise de poids et/ou des étourdissements ou une perte de conscience
- Une réaction allergique, incluant : une enflure au niveau de la bouche, de la langue, du visage ou de la gorge, des démangeaisons, une éruption cutanée et/ou de la difficulté à respirer

Si vous prenez une dose supérieure à la dose qui vous a été prescrite, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale même si vous vous sentez bien.

**N'arrêtez pas de prendre le bosentan (Tracleer®), à moins d'un avis contraire de la part de votre équipe médicale.**



L'ASSOCIATION D'HYPERTENSION  
PULMONAIRE DU CANADA  
PULMONARY HYPERTENSION  
ASSOCIATION OF CANADA



Pour en apprendre davantage sur l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et sur les traitements disponibles, veuillez visiter le [www.ahtpcanada.ca/en-savoir-plus](http://www.ahtpcanada.ca/en-savoir-plus).

Cette ressource éducative a été élaborée par le Réseau des professionnels de la santé traitant l'HTP, un réseau de l'AHTP Canada qui réunit des infirmières du domaine de l'HTP provenant de partout au pays en vue d'améliorer les soins infirmiers dans ce domaine, et ce, en favorisant le leadership, l'éducation et le perfectionnement professionnel.

Les renseignements fournis dans la présente ressource sont destinés à des fins éducatives seulement. Veuillez communiquer avec votre équipe médicale pour établir un plan de traitement personnalisé et pour discuter de tout changement à votre mode de vie ou à votre plan de traitement.