

Avez-vous des antécédents de prise de médicaments diététiques, de stimulants récréatifs ou de médicaments anticancéreux ?

- Les personnes qui ont pris certains coupe-faim (Aminorex, Fenfluramine, Dexfenfluramine, Phentermine et Mazindol) ou des stimulants à usage récréatif (cocaïne, méthamphétamine et amphétamines) présentent un risque plus élevé de développer un type d'hypertension pulmonaire (HTP) appelé hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).
- Certains médicaments utilisés pour traiter le cancer ont également été signalés comme étant à l'origine de l'HTP, tels que : Bléomycine, Busulfan, Carmustine, Interféron-alpha, Interleukine-2, Lomustine, Mitomycine C, Nitrosourées et Dasatinib.

Que sont l'HTP et l'HTAP ?

- L'hypertension pulmonaire (HTP) est une maladie qui peut frapper n'importe qui, quels que soient l'âge, le sexe ou les antécédents, et on estime que 10 000 Canadiens en sont actuellement atteints.
- L'HTP se définit par une pression sanguine élevée dans les artères des poumons, qui provoque une hypertrophie et une faiblesse du côté droit du cœur. Cela peut entraîner une insuffisance cardiaque, voire la mort.
- L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie dans laquelle le sang ne peut pas circuler normalement dans les poumons en raison d'un rétrécissement des artères. Il en résulte une augmentation de la pression sanguine dans les poumons, ce qui oblige le cœur à travailler davantage pour pomper le sang dans les poumons.
- Il n'existe actuellement aucun traitement curatif de l'HTAP, mais il existe divers traitements qui peuvent aider à gérer les symptômes et à ralentir la progression de la maladie.

Symptômes

- Essoufflement
- Intolérance à l'effort
- Gonflement des pieds/jambes
- Évanouissement
- Fatigue
- Douleur thoracique
- Sensation de tête légère
- Lèvres/doigts bleus

1. **S'informer** : Reconnaissez les symptômes de l'HTP. Si vous avez des antécédents de consommation de drogues et que vous présentez ces symptômes, parlez de la HTP à votre médecin.
2. **Obtenir un dépistage** : Le principal test de dépistage de l'HTP est l'échocardiographie. D'autres tests peuvent être nécessaires pour mesurer le fonctionnement de votre cœur et de vos poumons.
3. **Se faire recommander** : Il existe des cliniques HTP dans tout le Canada. Pour plus d'informations, consultez le site www.ahtpcanada.ca/pensezHTP

